索布佐生和阿霉素对小鼠白血病 P388 的协同作用

戴志强, 许建一, 袁幸菊, 蔡俊超 (中国科学院上海药物研究所, 上海200031, 中国)

Synergism of sobuzoxane in combination with doxorubicin against leukemia P388 in mice

DAI Zhi-Qiang, XU Jian-Yi, YUAN Xing-Ju, CAI Jun-Chao

(Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200031, China)

KEY WORDS sobuzoxane; doxorubicin; leukemia P388; myocardium; drug synergism; electron microscopy

AIM: To study the antitumor activity of sobuzoxane (Sob) in combination with doxorubicin (Dox) and the effect of Sob on Dox-induced cardiotoxicity. **METHODS:** DBA/2 mice bearing transplanted leukemia P388 were given iv Dox 2 mg·kg⁻¹·d⁻¹ for 3 d, 4 mg·kg⁻¹·d⁻¹ for 1 d combined with ig Sob 20, 40 mg·kg⁻¹·d⁻¹ for 7 d. The increase in life span (ILS) of each group was recorded in 30 d. The myocardium of moribund mice was examined by transmission electron microscopy. **RESULTS:** The ILS of combination therapeutic groups of Sob with Dox was 48.7%, 57.3%, 59.0%, and 62.4% respectively, which were 30%–90% higher than the sum of ILS of two groups treated with Dox and Sob separately (*P* < 0.01). The ultrastructural injury of cardiomyocytes of P388-bearing mice caused by combination chemotherapy with Dox plus Sob was markedly attenuated compared with Dox alone. **CONCLUSION:** Sob with Dox exhibited an antitumor synergistic effect on leukemia P388, and the cardiotoxicity of Dox was reduced by Sob.

关键词 索布佐生; 阿霉素; 白血病 P388; 心肌; 药物协同作用; 电子显微镜检查

目的: 研究索布佐生(Sob)与阿霉素(Dox)联合应用的抑瘤作用以及 Sob 对 Dox 诱导的心脏毒性的影响。 **方法:** DBA/2 小鼠接种 P388 细胞, 次日起 iv Dox 2 mg·kg⁻¹·d⁻¹ × 3 d 及 4 mg·kg⁻¹·d⁻¹ × 1

d, ig Sob 20 mg·kg⁻¹·d⁻¹ × 7 d 及 40 mg·kg⁻¹·d⁻¹ × 7 d, 配对联用。统计各组的生命延长率 (ILS); 电镜观察荷瘤鼠垂死前的心肌毒性表现。 **结果:** 联合用药组的 ILS 分别为 48.7%, 57.3%, 59.0% 和 62.4%, 是 Sob 和 Dox 单药应用 ILS 之和的 130%–190%; 荷瘤鼠心肌细胞的超微结构损伤较单用 Dox 组明显减轻。 **结论:** Sob 与 Dox 联用对小鼠白血病 P388 有显著的抑瘤协同作用; Sob 能降低 Dox 所致的心肌毒性。

索布佐生 (sobuzoxane, Sob, 代号 MST-16) 系我所首先合成的乙亚胺 (ICRF-154) 的衍生物^[1]。与同类化合物乙亚胺、丙亚胺 (razoxane) 相比, Sob 脂溶性强, 体内吸收容易, 化疗指数提高一倍左右^[2]。临床试用对恶性淋巴瘤、成人 T-细胞白血病有明显的疗效^[3,4]。日本厚生省业已批准上市^[5]。ip razoxane 与 Dox 联用对小鼠白血病 L1210 有抑瘤协同作用^[6], 但临床口服给药, 骨髓毒性增加, 与 Dox 联用效果不理想^[7]。为了寻找 Sob 临床扩大应用的可能性, 我们以小鼠白血病 P388 为模型, 观察 ig Sob 和 Dox 联合应用的抑瘤作用和 Sob 对 Dox 所诱导的心肌超微结构毒性的影响。

Chemical structure of sobuzoxane

4,4'-ethylenebis[1-(hydroxymethyl)-

2,6-piperazinedione]bis(isobutyl carbonate)

MATERIALS AND METHODS

Sob 由我所合成, 用 0.5% 羧甲基纤维素钠 (粘度 RH 300–600 cp 上海化学试剂站分装) 配制成混悬液。盐酸阿霉素系浙江省海门制药厂生产, 批号 920606, 以生理盐水溶解稀释。

清洁级 DBA/2 小鼠 123 只, 雌性, 体重 18–22 g, 由中国科学院上海实验动物中心提供 (合格证号: 中科 005)。

给药前一日(d₀) ip 接种 P388 细胞 5 × 10⁵ 个。随机分成 9 组, 生理盐水(NS)对照组 19 只, 其余各组均为 13 只, 每日定时给药, iv 后 1 h ig。各组给药方案如下:

- A) d₁-d₇ iv NS 0.2 mL; B) d₁ iv Dox 4 mg·kg⁻¹;
- C) d₁ iv Dox 4 mg·kg⁻¹, d₁-d₇ ig Sob 20 mg·kg⁻¹; D) d₁ iv Dox 4 mg·kg⁻¹, d₁-d₇ ig Sob 40 mg·kg⁻¹;
- E) d₁, d₃, d₅ iv Dox 2 mg·kg⁻¹; F) d₁, d₃, d₅ iv Dox 2 mg·kg⁻¹, d₁-d₇ ig Sob 20 mg·kg⁻¹;
- G) d₁, d₃, d₅ iv Dox 2 mg·kg⁻¹, d₁-d₇ ig Sob 40 mg·kg⁻¹;
- H) d₁-d₇ ig Sob 20 mg·kg⁻¹;
- I) d₁-d₇ ig Sob 40 mg·kg⁻¹.

各组从 d₀ 起, 每天称重, 观察 30 d 内死亡情况, 统计体重变化和生命延长率⁽⁹⁾。根据预初试验的结果, 在预测各组荷瘤鼠出现死亡前 1 d (个别前 2 d) 各组随机剖取 3 鼠心脏, 将心肌组织切割成 1 mm³ 左右小块, 经 2.5 % 戊二醛前固定, 1 % 锇酸后固定, 丙酮系列浓度脱水, 醋酸铀块染, 环氧树脂 618 包埋, LKB-III 型超薄切片机切割 50 nm 左右切片, 柠檬酸铅染色后, 在透射电镜下观察摄片⁽⁹⁾。

RESULTS

Sob 和 Dox 联用对小鼠白血病 P388 的作用

Dox 2 和 4 mg·kg⁻¹ 组以及 Sob 20 和 40 mg·kg⁻¹ 组单药应用对小鼠白血病 P388 的生命延长率除了 Sob 40 mg·kg⁻¹ 组有抑瘤边缘效应(生命延长率 26.5 %)外, 其余各组均不显著。而 Sob 和 Dox 联合用药组对小鼠 P388 白血病生命延长率非常显著 (P < 0.01)。分别为 48.7 %, 57.3 %, 59.0 % 和 62.4 %, 是 Sob 和 Dox 单药应用生命延长率之和的 130 % - 190 %。两药联用有明显的抑瘤协同作用。此外, 生理盐水对照组荷瘤鼠死亡前平均体重增加了 2.27 g; 单用 Dox 组平均体重减轻了 0.55 g 和 0.37 g。单用 Sob 组及 Sob 和 Dox 联用组平均体重增加 1 g 左右, 显示因药物毒性所致的体重减少较 Dox 组为轻 (Tab 1)。

各组荷瘤鼠垂死前的心肌细胞的超微结构观察

1 P388 对照组 荷瘤鼠心肌细胞超微结构基本正常。电镜下可见排列规则的肌原纤维。肌纤维附近线粒体密集, 内嵴丰富。脂滴偶见。细胞核大多单个; 核质分布均匀; 异染色质有边集现象。相邻细胞间可查见闰盘结构, 其纵切面呈阶梯状, 水平部分主要由粘合带和桥粒组成, 相邻膜之间有 20 nm 左右间距。在心肌细胞纵切面上, 肌浆网为扁囊状, 与横管构成偶合体 (Fig 1A, Plate 2)。

Tab 1. Effects of Sob ig in combination with Dox iv on mice bearing leukemia P388. $\bar{x} \pm s$. *P > 0.05, ^bP < 0.05, ^cP < 0.01 vs NS.

Group	Dose/ mg ·kg ⁻¹	On day	Times	Mice	Weight change/ g	Lifespan/ d	ILS/ %
NS			1-7	7	16	2.27	11.7 ± 2.2
Dox	4	1	1	10	-0.55	13.2 ± 1.4	12.8 ^a
Dox +	4	1	1	10	1.41	17.4 ± 3.2	48.7 ^c
Sob	20	1-7	7	7			
Dox +	4	1	1	10	0.47	18.4 ± 2.5	57.3 ^c
Sob	40	1-7	7	7			
Dox	2	1,3,5	3	10	-0.37	13.1 ± 0.7	12.0 ^a
Dox +	2	1,3,5	3	10	0.95	18.6 ± 3.2	59.0 ^c
Sob	20	1-7	7	7			
Dox +	2	1,3,5	3	10	0.98	19.0 ± 3.0	62.4 ^c
Sob	40	1-7	7	7			
Sob	20	1-7	7	10	0.37	14.0 ± 1.7	19.7 ^a
Sob	40	1-7	7	10	0.56	14.8 ± 1.3	26.5 ^b

2 单用 Sob 组 Sob 20 和 40 mg·kg⁻¹ 组荷瘤鼠心肌细胞超微结构改变轻微。镜下个别视野可见线粒体稍有肿胀, 少数线粒体内嵴小量丢失或模糊。其余细胞器未见明显异常 (Fig 1B)。

3 单用 Dox 组 Dox 4 mg·kg⁻¹ 组心肌细胞超微结构有明显改变, 主要表现为 1) 线粒体严重肿胀, 外膜破损, 内嵴减少或排列混乱, 甚至出现空泡, 个别可见髓样结构。2) 局部视野肌原纤维部分溶解, 肌球蛋白丢失, 肌原纤维变细, 细丝间透明区扩大。3) 个别视野肌浆网扩大; 闰盘间局部增宽 (Fig 1C)。Dox 2 mg·kg⁻¹ × 3 组的心肌细胞超微结构变化与 Dox 4 mg·kg⁻¹ 组相似, 但可查见的损伤范围稍大 (Fig 1D)。

4 Sob 和 Dox 联用组 Sob 20 mg·kg⁻¹, 40 mg·kg⁻¹ 与 Dox 4 mg·kg⁻¹ 联用组, 荷瘤鼠的心肌超微结构较单用 Dox 组损伤明显减轻。线粒体肿胀、内嵴丢失现象减少, 肌原纤维、肌浆网大多正常。闰盘扩张未查见 (Fig 1E)。Sob 20 和 40 mg·kg⁻¹ 与 Dox 2 mg·kg⁻¹ × 3 联用组的心肌细胞超微结构特点与上述联用组基本相似 (Fig 1F)。

DISCUSSION

Sob 口服毒性低, 小鼠急性 LD₅₀ > 5 g·kg⁻¹。

本实验采用 ig Sob 与 Dox 若干剂量配对联用, 对于小鼠白血病 P388 有显著的抑瘤协同作用, 为临床合并应用提供了实验依据。

电镜观察显示, 单用 Dox 组荷瘤鼠垂死前心肌细胞损伤范围较大, 线粒体、肌原纤维、肌浆网和闰盘等均可查见不同程度的改变。联合用药组荷瘤鼠心肌损害较单用 Dox 组明显减轻。实验提示, Sob 能降低 Dox 所致的心肌毒性。此结果对于扩大 Sob 的临床应用范围有积极意义。此外, 联合用药组较单用 Dox 组荷瘤鼠的平均体重增加 1 g 左右, 鉴于因胃肠道损伤所致的体重减轻是蒽环类抗生素的常见毒性之一^[10], 因此, Sob 对 Dox 所致胃肠道损伤是否有改善作用值得研究。

乙双吗啉(bimolane)降低柔红霉素的心脏毒性是代谢过程 ICRF-154 起作用^[11], Sob 的主要代谢产物也是 ICRF-154^[12], 由于 Sob 体内吸收容易, 血中 ICRF-154 浓度更高。ICRF-154 的进一步代谢产物是依地酸二酰胺化合物^[13]。依地酸类似物能与 Fe^{2+} 螯合, 减少 Fe-Dox 复合物的形成, 从而使 Dox 所诱导的超氧自由基减少, 降低对心脏的损害^[14]。因此, 推测 Sob 降低 Dox 心脏毒性可能与其代谢产物减少 Dox 所诱导的自由基形成有关。

REFERENCES

- 1 Cai JC, Shu HL, Tang CF, Komatsu T, Matsuno T, Narita T, *et al.* Synthesis and antitumor properties of N¹-acyloxymethyl derivatives of bis (2,6-dioxopiperazine). *Chem Pharm Bull* 1989; **37**: 2976-83.
- 2 Narita T, Yaguchi S-I, Komatsu T, Takase M, Hoshino A, Inaba M, *et al.* Antitumor activity of MST-16, a novel derivative of bis (2,6-dioxopiperazine), in murine tumor models. *Cancer Chemother Pharmacol* 1990; **26**: 193-7.
- 3 Ohno R, Masaoka T, Shirakawa S, Sakamoto S, Hirano M,

- Hanada S, *et al.* Treatment of adult T-cell leukemia/lymphoma with MST-16, a new oral antitumor drug and a derivative of bis(2,6-dioxopiperazine). *Cancer* 1993; **71**: 2217-21.
- 4 Masaoka T, Kageyama T, Tatsumi N, Akasaka K, Yonezawa T, Sugiyama H. Late phase II study of MST-16 (sobuzoxane) efficacy for malignant lymphoma. *Jpn J Cancer Chemother* 1992; **19**: 339-47.
 - 5 Five worldwide NCEs approvable in Japan. *Scrip* 1994; (1906): 24.
 - 6 Kline I. Potentially useful combinations of chemotherapy detected in mouse tumor systems. *Cancer Chemother Report Pt 2* 1974; **4** (1): 33-43.
 - 7 Giuliani F, Casazza AM, Marco AD, Savi G. Studies in mice treated with ICRF-159 combined with daunorubicin or doxorubicin. *Cancer Treat Reports* 1981; **65**: 267-76.
 - 8 Sakamoto H, Kawamitsu H, Miwa M, Terada M, Sugimura T. Enhancement of antitumor activity of bleomycin by benzamide *in vitro* and *in vivo*. *J Antibiot* 1983; **36**: 296-300.
 - 9 Dai ZQ, Yu YG, Zhu PP, Yuan XJ, Xu JY, Li XY. Effect of L-4-oxalysine on ultrastructures of liver cells in mice. *Acta Pharmacol Sin* 1991; **12**: 336-40.
 - 10 Herman EH, El-Hage AN, Ferrans VJ, Witiak DT. Reduction by ICRF-187 of acute daunorubicin toxicity in syrian golden hamsters. *Res Commun Chem Pathol Pharmacol* 1983; **40**: 217-31.
 - 11 Herman EH, El-Hage AN, Creighton AM, Witiak DT, Ferrans VJ. Comparison of the protective effect of ICRF-187 and structurally related analogues against acute daunorubicin toxicity in syrian golden hamsters. *Res Commun Chem Pathol Pharmacol* 1985; **48**: 39-54.
 - 12 Tanabe K, Ikegami Y, Ishida R, Andoh T. Inhibition of topoisomerase II by antitumor agents bis (2,6-dioxopiperazine) derivatives. *Cancer Res* 1991; **51**: 4903-8.
 - 13 Herman EH, Ferrans VJ, Young RSK, Hamlin RL. Effects of pretreatment with ICRF-187 on the total cumulative dose of doxorubicin tolerated by beagle dogs. *Cancer Res* 1988; **48**: 6918-25.
 - 14 Herman EH, Ferrans VJ, Bhasker Bhat H, Witiak DT. Reduction of chronic doxorubicin cardiotoxicity in beagle dogs by bis-morpholinomethyl derivative of razoxane (ICRF-159). *Cancer Chemother Pharmacol* 1987; **19**: 277-81.